

Aviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

16 apr 26

SITUAZIONE

Dopo un altro inverno ancora solo 'tiepido' l'esordio della primavera è stato, nel complesso, caldo asciutto. Ciò ha determinato, un'accelerazione del germogliamento notevole soprattutto negli ultimi 10 giorni. Ora lo sviluppo medio raggiunge va dai 25 cm del Nebbiolo (seppur anche oltre i 40 nelle posizioni meglio esposte) ai 4-6 cm di erbaluce e Croatina nelle posizioni più tardive. Dopo la prima perturbazione appena conclusa con apporti piovosi piuttosto limitati (ordine 20-30 mm), è previsto bel tempo perdurante almeno fino a sabato.

A seguire nuova instabilità sulla prima parte della prossima settimana.

Ad oggi l'annata presenta nuovamente un anticipo storico, solo di un paio di giorni inferiore a quello delle più recenti straordinarie in avvio (2024 in primis. Più in là ed in prospettiva a fine mese, anche il confronto ricostruito con il 1990 regge..

Rischio

PERONOSPORA

Le prossime piogge dopo quelle cadute che si si possono considerare preparatorie saranno utili per possibile innesco di infezioni primarie. Ci sono tanti fattori di rischio, nonostante la modellistica previsionale presenti attualmente un profilo di rischio basso, da tenere in considerazione assieme al primo dello sviluppo vegetativo notevole con conseguente diffusa ricettività della vegetazione. Sussiste inoltre il rischio di avvio di infezioni di Escoriosi in generale diffusione nelle ultime annate. La difesa deve tener conto inoltre, con lo sviluppo attuale, della prevenzione antioidca essendo già stato modellizzato l'avvio di infezioni ascosporighe del patogeno.

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PRIMO TRATTAMENTO

TRA
 DOMANI
 SABATO

INTERVALLO DATA
17 APRILE
18 APRILE

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENcate

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMITE \$ INDICA S.A. Candidata alla Sostituzione\$

<<<<< **SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3***. (IDEM VALE PER I COMBO.PACK)** >>>>>

1 FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4), FLUAZINAM(3), FOLPET(SL).

OPPURE

2 FAMIGLIA/GRUPPO: \$ COPERTURA RAMEICI \$ (5 KG RAME METALLO/ANNO MAX. 12 KG/MAX DAL 2025 AL 2027)
6 FAMIGLIA/GRUPPO: Qil (3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO): CIAZOFAMIDE (3), AMISULBROM (3, MA NON Più DI 2 CONSECUTIVI SE USATO DA SOLO)
NEL CASO DEL RAME UTILIZZARE FORME CHIMICHE A MAGGIOR PERSISTENZA/MINOR FITOTOSSICITÀ TRA SOLFATO TRIBASICO E OSSICLORURO, OSSIDULO. RIDURRE ALTRESI I DOSAGGI!

ULTERIORI IMPORTANTI SPECIFICHE

IN QUESTO MOMENTO LA DIFESA Può ESSERE IMPOSTATA SU CRITERIO DI RISCHIO RIDOTTO. SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRIVILEGIARE LE SOSTANZE ATTIVE CON MIGLIOR PROFILO ECO-TOSSICOLOGICO, CON GLI APPORTI MINIMI CONSENTITI IN RELAZIONE AL RIDOTTO SVILUPPO DEI GERMOGLI E MINORI VOLUMI DI BAGNATURA!!!

I N ALTERNATIVA ALL'UTILIZZO DEI COPERTURA INDICATI AL PUNTO 1/6 SI Può UTILIZZARE

7 ZOAMIDE* (4)**

VISTA LA RAPIDITA' DELLA CRESCITA ED ESPANSIONE FOGLIARE UTILE. IN ASSOCIAZIONE ALLE 'COPERTURE' SOPRA INDICATE

9 CIMOXANIL* (3)**

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPALI ATTIVI, AVVERSI* VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSI* TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).

16 apr 26

Aviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

Rischio

OIDIO (MAL BIANCO)

2

Come riportato i modelli indicano la partenza delle infezioni. Pertanto l'avvio della difesa è strettamente raccomandato. Eventualmente sarà da modulare in funzione della sensibilità specifica del vitigno/vigneto/posizione

SOLTANTO NELLE SITUAZIONI PIÙ' PROBLEMATICHE/SOGGETTE SI CONSIGLIA L'ASSOCIAZIONE DI QUESTI PRODOTTI

2 MEPTILDINOCAP(2MAX) !!! ULTIMO ANNO DI IMPIEGO !!!

OPPURE 3 SPIROXAMINA (3T/MAX) (consigliati due trattamenti di seguito a dosaggio in aumento, come da etichetta)

MENTRE NELLE SITUAZIONI MENO PROBLEMATICHE SI CONSIGLIA L'ASSOCIAZIONE DI SOLI PRODOTTI A BASE DI ZOLFIO

VALUTARE ANCHE ALTERNANZA/COMPLEMENTO CON LE S.A/AG. ATT. MICRO/BIOLOGICHE. I QUALI CEREVISANE

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).