

10

16 lug 26

## SITUAZIONE

La prima metà del mese di luglio si è chiusa con scarsi apporti di pioggia (ampiamente sotto i 10 mm) e con un evento grandinigeno in apertura che ha interessato il confine sud orientale tra Ghemme e Sizzano, con danni anche importanti nel centro più attivo del nucleo temporalesco. Siamo nel pieno della terza ondata di calore dell'anno che dovrebbe finalmente concludersi nel weekend. Non esclusi ulteriori apporti temporaleschi tra domani e martedì con ripresa conseguente (inutile ma da considerare) di bagnature fogliari. L'invasiatura si è presentata con segnali di esordio record in zone/viti particolarmente sofferenti ma ora pare in stasi come evidenza di necessità idrica per proseguire

## PERONOSPORA ED OIDIO

RISCHIO

*Rischio resta molto basso per entrambi i patogeni salvo necessità di tutela parete vegetativa da ripresa attacchi legata ad aumento umidità/calore temperature da settimana prossima*

*Su erbaluce si consiglia di effettuare l'ultimo trattamento. Si ricorda che il grado di sensibilità delle bacche agli attacchi all'odio è calante al procedere/ e si conclude al compimento dell'invaitura (resistenza ontogenetica). Per cui nel prossimo trattamento escludere zolfo anche su rossi precoci*

Si consiglia: **TRA SABATO 18 E LUNEDÌ 20** RINNOVARE la copertura

*Fare fare ricorso a f.c. contenenti Zolfo in formulazione bagnabile o bicarbonato di potassio, p.a. quest'ultimo che può esplicare, nelle condizioni che si prospettano, un'attività preventiva generale antifungina.*

*In aggiunta, in copertura antiparassitaria ricorre a formulati rameici a maggior persistenza ai dosaggi minimi di etichetta. Si rammenta che sono considerati già ampiamente efficaci a tutti gli effetti di difesa apporti di rame metallo ad ettagio di 200 grammi. Pertanto un prodotto che contiene il 25% di rame, salvo indicazioni di etichetta, può essere utilizzato tranquillamente a dosaggi di 1 kg/ha.*

**Utilissimo in questo contesto l'eventuale ricorso a formulati (micro) biologici già elencati nei precedenti bollettini tanto più se multi-target**

## ALTRI CONSIGLI

**ATTENZIONE ALLA GESTIONE DELLE SFOGLIATURE.** L'ANNATA PRESENTA TUTTE LE CARATTERISTICHE AFFINCHÉ SI MANIFESTINO STRESS IDRICI E TERMICI SU GRAPPOLI, TANTO PIÙ SE TROPPO ESPOSTI. SI SONO GIÀ MANIFESTATI DANNI A PARTIRE DAL 15 GIUGNO CON I PRIMI INNALZAMENTI DELLE T SOPRA I 35°C

INTERROMPERE ASSOLUTAMENTE LA SFOGLIATURA IN QUESTA FASE DI PRE INVAIATURA

**TRINCIATURA DEL COTICO ERBOSO:** REGOLARE CORETTAMENTE LA BARRA PER NON ESEGUIRE TAGLI TROPPO A RASO. SI RICORDA OBBLIGO DI SFALCIO A FILARI ALTERNI (SALVO AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI COME DI SEGUITO SPECIFICATO)

**SECONDO. INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCENTZA DORATA/POPILLIA JAPONICA . ATTENZIONE SINTOMI LAMPANTI DI FLAVESCENTZA IN AUMENTO!!**

RIVEDERE DATE/PRODOTTI INDICATI IN 2ª PAG. APPOSITO BOLLETTINO PRECEDENTE NR 9. **ATTENZIONE** P. PIETROIDI GENERT.TE INCOMPATIBILI CON RAMEICI

**BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE**

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPALI ATTIVI, AVVERSAZIONI VERSO LE QUALI NON SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI OREGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE E' LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO