

2

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

24 apr 26

OIDIO (MAL BIANCO)

Rischio

2

Riscontro dei primi sintomi di infezioni del fungo. Valutare di modulare la difesa in funzione della sensibilità specifica del vigneto/posizione/storicità

SOLTANTO NELLE SITUAZIONI PIÙ' PROBLEMATICHE/SOGGETTE SI CONSIGLIA L'ASSOCIAZIONE DI QUESTI PRODOTTI

MEPTILDINOCAP(2MAX) !!! ULTIMO ANNO DI IMPIEGO !!!

OPPURE SPIROXAMINA (3T/MAX) (consigliati due trattamenti di seguito a dosaggi in aumento, come da etichetta)

MENTRE NELLE SITUAZIONI MENO PROBLEMATICHE SI CONSIGLIA L'ASSOCIAZIONE DI SOLI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO

PREFERIBILMENTE IN FORMA LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO. ATTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI DITHIANON IN DIFESA ANTIPERONOSPORICA

VALUTARE ANCHE ALTERNANZA/COMPLEMENTO CON LE S.A./AG. ATT. MICRO/BIOLOGICHE. I QUALI CEREVISANE

***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/ BIOLOGICI : CEREVISANE* LAMINARINA*, OLIO DI ARANCIO DOLCE (TUTTE 3 S.A. con DOPPIO TARGET SIA ANTIODICO CHE ANTI- PERONOSPORICO. * aggiuntiva efficacia antiBotritica)

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPI ATTIVI, AVVERSAITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO. (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSAITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RESPECTO AMBIENTALE)