3

30 apr 26

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

SITUAZIONE

Questa settimana è proseguito il rapido sviluppo dei germogli e delle infiorescenze che proiettano la vite velocemente - con le temperature nuovamente elevate previste nei prossimi giorni- all'inizio della fioritura già previsto con un nuovo anticipo straordinario. Gli apporti temporaleschi in settimana sono stati contenuti. Da inizio settimana prossima, con ancora notevole incertezza su lunedi, è prevista una parentesi temporalesca piuttosto lunga ed intensa. Si raccomanda di seguire attentamente l'aggiornamento di tali previsioni

Rischio

3

PERONOSPORA

La previsione di tale situazione temporalesca perdurante che cade in concomitanza della fase fenologica sostanzialmente di pre.fioritura (precocissima) cambia sostanzialmente la valutazione del rischio.

INTERVALLO DATA

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO **2** MAGGIO

TRA

SABATO **4** MAGGIO

LUNEDI

!!!!! attenzione!! SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI SUL GIORNO DELL'INIZIO DELLA FASE TEMPORALESCA, POSTICIPANDO L'INTERVENTO IL Più POSSIBILE IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE!!!!! Non RISCHIARE DI ESSERE SCOPERTI OLTRE 8-9 GIORNI DAL PRECEDENTE TRATTAMENTO SOPRATTUTtO SE EFFETTUATO PRIMA DEL 25.4

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENCATE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMTE $ INDICA S.A. Candidata alla Sos

<<<<< **SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3***. (IDEM VALE PER I COMBO.PACK)**

FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) , FLUAZINAM(3), FOLPET(SL).

IN MISCELA CON **5 FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3 TRATT. TOTALI/ MAX /ANNO) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). $METALAXIL$(2 TRATT.MAX INCROCIATI CON $ FLUOPICOLIDE S)**

ULTERIORI IMPORTANTI SPECIFICHE

CONSIDERANDO LA FORTE VELOCITA' DI CRESCITA RAPIDA CHE RIPRENDERA' NEI PROSSIMI GIORNI, IL POSIZIONAMENTO DEL TRATTAMENTO Più POSSIBILE A RIDOSSO DI MARTEDI è STRATEGICO SI RACCOMANDANO APPORTI **APPORTI MINIMI CONSENTITI IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA PARETE FOGLIARI (E RELATIVO RIDOTTO VOLUME DI DISTRIBUZIONE)**

IN ALTERNATIVA ALL'UTILIZZO DEI COPERTURA INDICATI AL

7 ZOXAMIDE (4) **11 $ FLUOPICOLIDE $*** (2) (2MAX INCROCIATI CON METALAXIL)**

VISTA LA RAPIDITA' DELLA CRESCITA ED ESPANSIONE FOGLIARE UTILE, IN ASSOCIAZIONE ALLE 'COPERTURE' SOPRA INDICATE, L'AGGIUNTA

FAMIGLIA/GRUPPO: "INDUTTORI SISTEMICI": (8 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL-AL; FOSFITO DI POTASSIO-K-, FOSFO.TO DI DISODIO-Na-. TUTTI SENZA LIMITE (SL) DA QUEST'ANNO.

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITà VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITà ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTA' SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).

Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Cavaglia d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Maggiora
Sizzano Boca
Bogogno Ghemme
Briona Fara Cressa

VIGNAIOLI PIEMONTESI

Città europea del vino 2024
European Wine City 2024

3

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

30 apr 26

Rischio

2

OIDIO (MAL BIANCO)

Prosegue riscontro dei primi sintomi di infezioni fogliari del fungo. La vite entra nella fase di elevata sensibilità di attacchi anche alle infiorescenze su vitigni sensibili (Nebbiolo in primis)

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

4 FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). $ DIFENO $ / $ TEBU $- CONAZOLO (1 AL MAX ALTERNATIVI)

OPPURE 3 SPIROXAMINA (3T/MAX) (consigliati due trattamenti di seguito a dosaggio in aumento, come da etichetta)

O IN FINE 2 MEPTILDINOCAP(2MAX) !!! ULTIMO ANNO DI IMPIEGO !!!

O IN FINE

SE NON GIA' IN FORMULAZIONE AGGIUNGERE ZOLFO A BASSI DOSAGGI PREFERIBILMENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO (ATTENZIONE CON DITHIANON)

VALUTARE ANCHE ALTERNANZA/COMPLEMENTO CON LE S.A/AG. ATT. MICRO/BIOLOGICHE.I QUALI CEREVISANE, COS-OGA, LAMINARINA E ED ALTRE

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITà VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITà ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).