

4

12 mag 26

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

SITUAZIONE

Dall'inizio del mese di maggio ad oggi l'apporto pluviometrico si chiude su un ordine relativamente contenuto intorno ai 30-60 mm a seconda delle zone. L' inizio della fioritura del Nebbiolo è atteso nelle zone M E D I E entro 3-5 giorni a seconda del regime meteo (T massime in particolare e rallentamento nella fase temporalesca prevista per giovedì-venerdì). Esso si registra come evento straordinario in quanto ad ora è ancora confrontabile (in pareggio o con solo un paio di giorni di ritardo in prospettiva) soltanto con un'altra annata in precedenza... (Partendo dal 1990). Dopo il passaggio temporalesco sopra indicato le previsioni meteo preannunciano (con netto capovolgimento) una relativa stabilità perdurante nei prossimi 10 giorni)

PERONOSPORA

Rischio

In relazione alla fase fenologica di pre-(inizio)fioritura di estrema sensibilità in concomitanza del nuovo passaggio temporalesco indicato permane una valutazione di rischio medio-elevata confermata dai modelli previsionali.

INTERVALLO DATA

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

ASSOLUTAMENTE ENTRO

GIOVEDÌ

14 MAGGIO

MATTINA

!!!! attenzione!! l' INTERVENTO GIOVEDÌ MATTINA (PER PICCOLI VIGNETI) VA VALUTATO SOLO SEGUENDO LE PREVISIONI A BREVISSIMO TERMINE NEL CASO CONFERMASSERO LA TENUTA. IN CASO DI DUBBIO MEGLIO ASSOLUTAMENTE INTERVENIRE GIÀ DOMANI. SI SCONSIGLIA (!!) INVECE L'INTERVENTO OGGI A CAUSA DELLE CONDIZIONI VENTOSE

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENCA TE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMITE \$ INDICA S.A. Candidata alla S

<<<<< SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3***. (IDEM VALE PER I COMBO PACK)
: FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) , FLUAZINAM(3), FOLPET(SL).

IN MISCELA CON 5 FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3 TRATT. TOTALI/ MAX /ANNO) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). \$METALAXIL\$(2 TRATT.MAX INCROCIATI CON \$ FLUOPICOLIDE S)
OPPURE 4 FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO). DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRA FAMIGLIA. IPROVALICARB, MANDIPROPAMIDE, VALIFENALATE . TUTTI SL

IN ALTERNATIVA ALL'UTILIZZO DEI COPERTURA SOPRA INDICATI SI PUÒ UTILIZZARE

7 ZOAMIDE (4) 11 \$ FLUOPICOLIDE \$*** (2) (2MAX INCROCIATI CON METALAXIL) DA USARE SEMPRE IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI PARTNERS

SE COMPATIBILE E NON GIÀ IN FORMULAZIONE UTILE PROSEGUIRE RINFORZO CON L'AGGIUNTA DI

: FAMIGLIA/GRUPPO: "INDUTTORI SISTEMICI": (8 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL-AL; FOSFITO DI POTASSIO-K-, FOSFO.TO DI DISODIO-Na-. TUTTI SENZA LIMITE (SL) DA QUEST'ANNO.

SI CONSIGLIA L'AGGIUNTA DI PRODOTTI FOGLIARI A BASE ESCLUSIVA DI BORO PER FAVORIRE L'ALLEGAGIONE

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

