

25 mag 26

SITUAZIONE Il presente bollettino viene messo solo in forma sintetica per contingenti problematiche tecniche

Si confermano le indicazioni del precedente bollettino nr 5. Stiamo assistendo a giornate estive con temperature straordinarie in crescendo a partire dai 30°C del 22.5. Non è escluso che tra domani e giovedì avremo notti tropicali. Anche l'umidità relativa dell'aria è stata su valori (medi) piuttosto contenuti, dell'ordine anche inferiore al 60%. Confermata altresì netta accelerazione dell'avanzamento della fioritura su tutti i vitigni (in coda la croatina) con Nebbiolo anche verso l'allegagione nelle posizioni più precoci. La fase temporalesca è stata ridimensionata e spostata da domenica

OIDIO e PERONOSPORA

Si conferma una situazione di rischio complessivamente molto basso, seppur l'Oidio meriti attenzione preventiva su vigneti/vitigni particolarmente predisposti o soggetti in passato data la concomitante fase fenologica a cavallo della fioritura già menzionata di estrema sensibilità

INTERVALLO DATA

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

ASSOLUTAMENTE ENTRO

TRA DOMANI E GIOVEDÌ

27-28 MAGGIO

!!!! ATTENZIONE !!!!!

ATTENZIONE! FONDAMENTALE GARANTIRE UNA COPERTURA ANTIOIDICA, ANCHE SOLO CON ZOLFO IN POLVERE (RAMATO) A NON PIÙ DI 14 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO CON QUESTO TARGET. In tal caso, COME GIÀ INDICATO, UTILIZZARE DOSAGGI AD ETTARO RIDOTTI SU 20 KG DATI I PICCHI DI TEMPERATURA PROSSIMI AI 35 GRADI

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMITE \$ INDICA S.A. Candidata alla Sostituzione\$

<<<<<< SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3** (IDEM VALE PER I COMBO.PACK) >>>>>>

7 ZOAXAMIDE (4)

EVENTUALMENTE IN MISCELA CON 10**OXATHIAPROLIN*** (2MAX SEMPRE IN MISCELA)

OPPURE FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA , FLUAZINAM(3), DITHIANON (4) FOLPET(SL).

in alternativa

OPPURE 1 \$ FLUOPICOLIDE \$** (2) (2MAX INCROCIATI CON METALAXIL) DA USARE SEMPRE IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI PARTNERS

SE COMPATIBILE E NON GIÀ IN FORMULAZIONE UTILE PROSEGUIRE RINFORZO CON L'AGGIUNTA DI

, FAMIGLIA/GRUPPO: "INDUTTORI SISTEMICI": (8 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL-AL; FOSFITO DI POTASSIO-K-, FOSFO.TO DI DISODIO-Na-. TUTTI SENZA LIMITE (SL) DA QUEST'ANNO.

PER L'OIDIO PROSEGUIRE NELL'ALTERNANZA TRA

4 FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). \$ DIFENO \$ / \$ TEBU \$- CONAZOLO (1 AL MAX ALTERNATIVI)

5 FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO) : AZOXY (2)/TRIFLOXY(3)- PYRACLO(3)/ STROBYN

Nei vigneti con allegagione avanzata, di Nebbiolo in particolare possibile infine il ricorso a

8 FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2); BOSCALID (1MAX) MEGLIO RISERVARE L'UTILIZZO DI QUEST'ULTIMO FUNGICIDA IN FASE DI PRE-CHIUSURA GRAPPOLO

SE NON GIÀ IN FORMULAZIONE AGGIUNGERE ZOLFO A BASSI DOSAGGI PREFERIBILMENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO (ATTENZIONE CON DITHIANON)

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).