

SITUAZIONE

Fase fenologica: Da grano di pepe del Nebbiolo nei siti precocissimi a pre- solo inizio fioritura di uva rara e a seguire, ultima, crotina di quelli più tardivi.

PERONOSPORA

RISCHIO

LA MALATTIA PROGUE INESORABILE NEL SUO SVILUPPO NEI VIGNETI 'SPIA' (TESTIMONI O NON ADEGUATAMENTE TRATTATI), CON AUMENTO DELLE MACCHIE FOGLIARI E, PIÙ NETTAMENTE, DI QUELLO DEGLI ATTACCHI ALLE INFIORESCENZE/GRAPPOLINI. NE SONO COLPITI, NEI CASI PIÙ GRAVI FINO AL 20%. AUMENTA ANCHE LA SPORULAZIONE (MUFFETTA BIANCA NELLA PAGINA FOGLIARE E, DI RECENTE SUI BOTTONI FIORALI). L'ANNATA CONFERMA LA SUA STRAORDINARIA VIRULENZA. NELLE ZONE PIÙ FREDE E' VEROSIMILMENTE MENTO PRESENTE, MA QUESTO NON DEVE FAR ABBASSARE LA GUARDIA PERCHE' SE NE ATTENDE, A BREVE, UNA RAPIDO PEGGIORAMENTO LEGATO ALL'INCREMENTO DELLE TEMPERATURE. AGGRAVATO, DALLA PROSPETTATA ELEVATA TENDENZA TEMPORALESCA DA DOMENICA E PER TUTTA LA SETTIMANA ENTRANTE

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO ENTRO SABATO 8 GIUGNO

ANTICIPANDO ASSOLUTAMENTE LA NUOVA FASE TEMPORALESCA PREVISTA DA DOMENICA

UTILIZZANDO

LE S.A. DI SEGUITO ELENCAE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIA' LE CONTENGONO

NB: TRA PARENTESI IL NUMERO MAX CONSIGLIATO DI TRATT./ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE= SL

***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4).
CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

****DATA L'ECCEZIONALITA' DELLE PIOGGE DI QUEST'ANNO E' POSSIBILE AUMENTARE IL LIMITE MASSIMO DI TRATTAMENTI DI

IN MISCELA CON

***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3), METALAXYL-M (3), METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

E/O

***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).

OPPURE

***FAMIGLIA/GRUPPO: QII (3): CIAZOFAMIDE (3), AMISULBROM (3, MA NON PIÙ DI 2 CONSECUTIVI SE USATO DA SOLO)

O IN FINE

ALTRE S.A "SINGOLE"

*** ZOXAMIDE** (4) ***AMETOCTRADINA** (QoS) (3). ***OXATHIPIPROLIN** (2MAX SEMPRE IN /

***FLUOPICOLIDE** (2)
2 MAX CON METALAXIL

OIDIO (MAL BIANCO)

RISCHIO

PROGUE CONTENUTO IL RISCONTRO DI SINTOMI FOGLIARI DEL PATOGENO. MA ATTENZIONE... E' IN AUMENTO QUELLO DI BLACK ROT E NON COSÌ INFREQUENTI I SINTOMI DI MUFFA GRIGIA (BOTRITE)

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

***FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN

***CIFLUFENAMID(2 T/MAX)

O

***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)

***FAMIGLIA/GRUPPO: "CMR" (2 TRATT. TOTALI /MAX/ANNO): PROQUINAZID (2), BUPIMIRATE (2), PYRIOFENONE(%) (2)

***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI :

Da usare in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai "tradizionali". Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/aversità.

TRATTAMENTO UNICO INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCENZA DORATA (VERSO VETTORE SCAPHOIDEUS TITANUS)

ATTENDERE! NON È ANCORA IL MOMENTO! LE INFORMAZIONI/DATE SPECIFICHE SARANNO DIVULGATE NEI PROSSIMI BOLLETTINI E' IN ATTENTA OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE ANCHE L'ANALISI E MONITORAGGIO RIGUARDANTE POPILLIA JAPONICA

SI CONSIGLIA DI PROCEDERE ALLA CIMATURA CON TEMPESTIVITA' SOPRATTUTTO SUI NEBBIOLI

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).