

Aviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

6 giu 26

SITUAZIONE

Giugno in avvio si è presentato con passaggi temporaleschi con quantitativi di pioggia complessivi variabili nella maggior parte dei casi entro i 30 mm +-10). Soltanto nei vigneti di Fara le piogge sono state decisamente maggiori. Del tutto inaspettati soprattutto gli apporti tra venerdì sera e sabato mattina in alcuni casi anche prossimi ai 10 mm. Prosegue il rapido sviluppo dei grappoli Nebbiolo ed Erbaluce in testa verso la bacca a dimensione pisello. Soltanto a inizio allegagione la Crotina di Boca, comunque con un conservato anticipo storico. La settimana entrante è prevista temporalesca in crescendo da martedì sera-mercoledì con temperature entro i 30°C più in linea con la norma del periodo.

OIDIO e PERONOSPORA

Si conferma una situazione di rischio complessivamente molto basso, seppur l'Oidio meriti attenzione preventiva su vigneti/vitigni particolarmente predisposti o soggetti in passato data la concomitante fase fenologica di allegagione-ingrossamento bacche di estrema ensibilità

INTERVALLO DATA

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

ASSOLUTAMENTE ENTRO

MARTEDI

09 GIUGNO

IN CASO DI IMPOSSIBILITA'-INCERTEZZA OPERATIVA PER LUNEDI-MARTEDI PROCEDERE ANCHE ASSOLUTAMENTE DOMANI. SOPRATTUTTO NEI VIGNETI DI FARA

!!!! ATTENZIONE !!!!!

ATTENZIONE! FONDAMENTALE GARANTIRE UNA COPERTURA ANTIOIDICA, ANCHE SOLO CON ZOLFO IN POLVERE (RAMATO) A NON PIÙ DI 14 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO CON QUESTO TARGET. In tal caso, COME GIÀ INDICATO, UTILIZZARE DOSAGGI AD ETTARO RIDOTTI SU 20 KG DATI I PICCHI DI TEMPERATURA PROSSIMI AI 35 GRADI

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMITE \$ INDICA S.A. Candidata alla Sostituzione\$

<<<<< SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3** (IDEM VALE PER I COMBO.PACK) >>>>>

FORMULATI RAMEICI

OPPURE

ZOXAMIDE (4)

EVENTUALMENTE IN MISCELA CON

OXATHIAPROLIN (2MAX SEMPRE IN MISCELA)

OPPURE FENILAMMIDI (3 T. MAX COMPLESSIVI) METALAXIL M, BENALAXIL M, METALAXIL (1 MAX, 2 COMPLESSIVI CON FLUOPICOLIDE

OPPURE

FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA , FLUAZINAM(3), DITHIANON (4)

FOLPET(SL).

SE COMPATIBILE E NON GIÀ IN FORMULAZIONE UTILE PROSEGUIRE RINFORZO CON L'AGGIUNTA DI

FAMIGLIA/GRUPPO: "INDUTTORI SISTEMICI": (8 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL-AL; FOSFITO DI POTASSIO-K-, FOSFO.TO DI DISODIO-Na-. TUTTI SENZA LIMITE (SL) DA QUEST'ANNO.

PER L'OIDIO PROSEGUIRE NELL'ALTERNANZA TRA

4 FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). \$ DIFENO \$ / \$ TEBU \$- CONAZOLO (1 AL MAX ALTERNATIVI)

5 FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO) : AZOXY (2)/TRIFLOXY(3)- PYRACLO(3)/ STROBYN

Nei vigneti con allegagione avanzata, di Nebbiolo in particolare possibile infine il ricorso a

8 FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2); BOSCALID (1MAX) MEGLIO RISERVARE L'UTILIZZO DI QUEST'ULTIMO FUNGICIDA IN FASE DI PRE-CHIUSURA GRAPPOLO

SE NON GIÀ IN FORMULAZIONE AGGIUNGERE ZOLFO A MEDI DOSAGGI PREFERIBILMENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO (ATTENZIONE CON DITHIANON)

MOLTO INDICATA IN QUESTA FASE LA COMPLEMENTARE DISTRIBUZIONE DI ZOLFO IN POLVERE (RAMATO) A DOSAGGI DI 25 KG/HA

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI